

蘭

療


方

上

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39



LAIKIOOHOO.



有自誤者

醫家則為

之臣僕也

藥療方序



蓋記今四五十年前世稱的毛  
藥方者只有些外科而已及生  
子者學也又傳生內科之一而之  
而今醫家者法乃至以不後如毛  
內科為然此種小技要亦也風之  
一更也然而外科其術與也者  
以是子再一也而生於後說由於

トットマ一ケニテ  
シヤクハカクシ

黃連五分 犀角細末五分 右三味先煮二味去

滓內犀角調勻頻々服

發劑初熱用之見傷寒 涼劑主放苗熱不退者見同症 寒劑

主毒熱太 多見同症 滋潤劑主血燥見虛勞 瀉劑主熱多欲驚者

見傷 托毒劑主毒內伏見驚風 活真劑主真元衰弱見

健忘 活潑劑解熱定驚見驚風 安魂湯主心煩見煩悶

清膽劑主真氣煩亂見胸症 喚真劑主厥冷見傷損 復陽

劑主同症見卒厥 運胃劑主胃虛見健忘 清渣劑主餘熱不

シケルプテワイドレインヘン  
SCHLIPPELIT DEYVEDE

解見 的里亞迦主腫不滿者見驚風 解毒露主毒熱太多見微瘡

麻疹

麻疹謂之麻設連。此為亦因地一發。腑內痰毒。與時運一種。惡疫相搏而所致也。療例散熱清毒為主。或伏毒腹痛者。瀉毒亦為可。唯如熱劑則始末不可俱服也。

發毒劑主初發疹者 獨活 索吾各三錢 炭粘子

二 右三味煮熟去滓分溫服。

蓋漢人未論及。當謂卓識也。

用硝子製之

此口以濕紙密封

使藥氣無漏泄也

物成入此滴露調勻分服



Stopen kal

陰陽既濟爐

陰陽既濟爐謂之寶葫蟄跬兒。一名列的爾篤。製造爐內有一羅棚。以盛藥物。棚下熱湯蒸鬱。徹於羅而翻登。則重蓋裏有冷水。以壓降。仍降滴於藥液口。其

圖如左

焉



灌水口宿水減則從是加入

漏水口宿水熱則從是漏去

RETORT

藥液口  
藥液從是點滴

此牙支縛皆使不以寬慢也



此把鼻順轉則上板升登以緊急縛處逆轉則板降下以縛處寬脫也。

Tourniquet

漏鍼

漏鍼謂之點律窟亞過尔。製造至細而有通空長二寸許。凡尿閉身腫大腹鼓滿。百方無効者。於或肚腹或脚脛刺之。則濁液從鍼空漏瀝。其圖如左也。



TRUKAAR

前鍼則蜜製而余試用之非便宜。故今製後鍼以任用焉。